

# WYSTĄPIENIE U UBEZPIECZONEGO POWIKŁAŃ POOPERACYJNYCH

RODZAJ PRZEPROWADZANEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO	POWIKŁANIE POOPERACYJNE BĘDĄCE NASTĘPSTWEM PRZEPROWADZANEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO	KATEGORIA POWIKŁANIA
Operacja usunięcia przepukliny brzusznej – <b>zabieg operacyjny</b> przeprowadzany metodą klasyczną lub laparoskopową, mający na celu usunięcie istniejącego worka przepukliny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usunięcie jądra</li> <li>• przecięcie tętnicy jądrowej</li> <li>• uszkodzenie tętnicy udowej</li> <li>• obrzęk niedokrwienny kończyny</li> <li>• pełnościennie uszkodzenie jelita cienkiego lub grubego</li> <li>• pełnościennie uszkodzenie pęcherza moczowego</li> </ul>	A A A A A A
Usunięcie tarczycy – <b>zabieg operacyjny</b> polegający na całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porażenie jednej lub obu strun głosowych powodujące trwającą powyżej trzech miesięcy dysfunkcję narządu głosu</li> </ul>	B
Usunięcie żyłaków kończyn dolnych – <b>zabieg operacyjny</b> polegający na usunięciu żyłakowato zmienionych żył powierzchownych kończyn dolnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymujące się powyżej trzech miesięcy uszkodzenie tętnicy udowej z upośledzeniem ukrwienia kończyny</li> <li>• utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia nerwu strzałkowego</li> </ul>	B B
Usunięcie żyłaków odbytu – <b>zabieg operacyjny</b> polegający na usunięciu żyłakowato zmienionych żył okolicy odbytu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nietrzymanie stolca</li> </ul>	B
<b>Zabiegi operacyjne</b> przeprowadzane na jelicie grubym	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pełnościennie uszkodzenie moczowodu</li> <li>• pełnościennie uszkodzenie pęcherza moczowego</li> <li>• całkowite rozejście się rany pooperacyjnej z wypadnięciem trzewi</li> <li>• rozejście się zespolenia jelitowego</li> <li>• wyłonienie sztucznego odbytu</li> <li>• pełnościennie uszkodzenie ściany dwunastnicy</li> </ul>	A A B B B A
<b>Zabiegi operacyjne</b> przeprowadzone w zakresie jamy brzusznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jatrogenne usunięcie śledziony</li> <li>• uszkodzenie dróg żółciowych z założeniem drenażu</li> </ul>	A A
Usunięcie tętniaka tętnicy głównej – <b>zabieg operacyjny</b> polegający na usunięciu nieprawidłowo zmienionego odcinka ściany tętnicy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• martwica jelita z założeniem sztucznego odbytu</li> <li>• niedokrwiennie uszkodzenie rdzenia kręgowego wraz z wystąpieniem utrzymujących się powyżej trzech miesięcy niedowładem lub porażeniem kończyny dolnej</li> </ul>	B B
Operacyjne leczenie kamicy układu moczowego – <b>zabieg operacyjny</b> polegający na chirurgicznym usunięciu złoju z nerki lub dróg moczowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uszkodzenie tętnicy nerkowej</li> <li>• uszkodzenie moczowodu z przetoką moczową</li> </ul>	B B
Operacyjne usunięcie gruczolaka stercza – <b>zabieg operacyjny</b> polegający na usunięciu gruczolaka stercza poprzez powłoki brzuszne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nietrzymanie moczu (nie dotyczy następstw radykalnego usunięcia stercza), utrzymujące się powyżej trzech miesięcy</li> </ul>	A
Elektroresekcja gruczolaka stercza – endoskopowy <b>zabieg operacyjny</b> , polegający na chirurgicznym usunięciu części gruczołu przy użyciu energii elektrycznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pełnościennie uszkodzenie pęcherza moczowego</li> </ul>	A
Usunięcie macicy, usunięcie przydatków, usunięcie mięśniaków macicy – <b>zabieg operacyjny</b> polegający na usunięciu macicy, przydatków lub mięśniakowato zmienionych fragmentów mięśniówki macicy przeprowadzony przez powłoki brzuszne lub metodą laparoskopową	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pełnościennie uszkodzenie ściany pęcherza moczowego</li> <li>• pełnościennie uszkodzenie ściany moczowodu</li> <li>• powstanie przetoki moczowodowo-pochwowej</li> <li>• powstanie przetoki pęcherzowo-macicznej</li> <li>• przebiecie jamy macicy z koniecznością operacyjnego otwarcia jamy brzusznej</li> </ul>	A A B B B
Cięcie cesarskie – <b>zabieg operacyjny</b> polegający na zabiegowym zakończeniu porodu poprzez nacięcie powłok brzusznych i macicy oraz ręcznym wydobywaniu płodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przetoka pęcherzowo-maciczna</li> </ul>	B
Operacje ortopedyczne – <b>zabiegi operacyjne</b> przeprowadzone na tkance kostnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia jednego ze wskazanych nerwów: nerwu strzałkowego, kulszowego bądź promieniowego</li> <li>• zator tłuszczowy powodujący ostry zespół niewydolności płucnej</li> </ul>	B B
Operacje torakochirurgiczne – <b>zabiegi operacyjne</b> przebiegające z otwarciem jamy opłucnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymujące się powyżej trzech miesięcy objawy uszkodzenia nerwu przeponowego</li> </ul>	B
Kardiochirurgiczne <b>zabiegi operacyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tamponada serca</li> <li>• rozejście się mostka</li> <li>• blok całkowity wymagający implantacji układu symulującego serca na stałe</li> <li>• wyprucie się implantowanej sztucznej zastawki</li> </ul>	B B B B
Operacje okulistyczne – <b>zabiegi operacyjne</b> przeprowadzane wewnątrz gałki ocznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• krwotok wypierający w trakcie <b>zabiegu operacyjnego</b> na gałce ocznej, skutkujący trwałą utratą widzenia w tym oku</li> <li>• zaćma wtórna jako powikłanie operacji wewnątrzgałkowych</li> </ul>	B A